

Si tiene inmunodepresión (un sistema inmunitario debilitado) moderada o grave, tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir a causa del COVID-19. Se recomienda que complete su dosis primaria de vacunas contra el COVID-19 si tiene 5 años de edad o más y, si tiene 12 años de edad o más, que reciba una dosis de refuerzo.

- Los niños de 5 a 11 años con inmunodepresión moderada o grave **deben recibir una dosis primaria de 3 dosis** de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Por el momento no se recomienda una dosis de refuerzo para este grupo de edad.
 - **Cantidad de dosis para completar la dosis primaria e intervalos son 3 dosis:**
 - 2.^a dosis: 3 semanas (21 días) después de la 1.^a dosis
 - 3.^a dosis: al menos 4 semanas (28 días) después de la 2.^a dosis
- Las personas de 12 años de edad o más con inmunodepresión moderada o grave **deben recibir un total de 4 dosis** de la vacuna contra el COVID-19. Las 4 dosis están conformadas por una dosis primaria de 3 dosis de una vacuna contra el COVID-19 de ARNm, más 1 dosis de refuerzo de una vacuna contra el COVID-19 de ARNm (4.^a dosis).
- Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer (disponible para individuos de 12 años o más)
 - **Cantidad de dosis para completar la dosis primaria e intervalos son 3 dosis:**
 - 2.^a dosis: 3 semanas (21 días) después de la 1.^a dosis
 - 3.^a dosis: al menos 4 semanas (28 días) después de la 2.^a dosis
 - **Cantidad de dosis para completar la dosis de refuerzo e intervalo:**
 - Una dosis de refuerzo al menos 3 meses después de la 3.^a dosis
- Vacuna contra el COVID-19 de Moderna (disponible para individuos de 18 años o más)
 - **Cantidad de dosis para completar la dosis primaria e intervalos son 3 dosis:**
 - 2.^a dosis: 4 semanas (28 días) después de la 1.^a dosis
 - 3.^a dosis: al menos 4 semanas (28 días) después de la 2.^a dosis
 - **Cantidad de dosis para completar la dosis de refuerzo e intervalo:**
 - Una dosis de refuerzo al menos 3 meses después de la 3.^a dosis

Las personas de 18 años de edad o más con inmunodepresión moderada o grave que recibieron 1 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson deben recibir una segunda dosis de una vacuna contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna (vacunas contra el COVID-19 de ARNm). También deben recibir una dosis de refuerzo, es decir **3 dosis en total**.

- **Cantidad de dosis para completar la dosis primaria e intervalos son 2 dosis:**
 - 1.^a dosis de J&J
 - 2.^a dosis de Pfizer o Moderna al menos 4 semanas (28 días) después de la 1.^a dosis
- **Cantidad de dosis para completar la dosis de refuerzo e intervalo:**
 - 1 dosis de refuerzo Pfizer o Moderna en la mayoría de los casos, al menos 2 meses después de la 2.^a dosis

Hay muchas enfermedades y tratamientos que pueden comprometer el sistema inmunitario de una persona. Hable con su médico acerca de su vacunación contra el COVID-19, dada su enfermedad.