

Las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son efectivas para proteger a las personas y evitar que se enfermen gravemente, sean hospitalizadas e incluso mueran. Al igual que con otras vacunas, las personas que “están al día” con sus vacunas tienen una protección óptima. Se recomienda que todas las personas de 5 años de edad o más completen su dosis primaria (dos dosis de Pfizer o Moderna y 1 dosis de J&J) contra el COVID-19 y reciban la dosis de refuerzo cuando sean aptos.

Personas inmunodeprimidas posiblemente necesiten recibir una dosis adicional (3ra dosis) como parte de su dosis primaria.

PFIZER	MODERNA	J&J
Edades recomendadas <ul style="list-style-type: none"> 5 años de edad y mas 	Edades recomendadas <ul style="list-style-type: none"> 18 años de edad y mas 	Edades recomendadas <ul style="list-style-type: none"> 18 años de edad y mas
Dosis primaria de vacunación <ul style="list-style-type: none"> 2 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas (21 días) 	Dosis primaria de vacunación <ul style="list-style-type: none"> 2 dosis administradas con un intervalo de 4 semanas (28 días) 	Dosis primaria de vacunación <ul style="list-style-type: none"> 1 dosis única
Vacunación completa 2 semanas después de la segunda dosis de la dosis primaria	Vacunación completa 2 semanas después de la segunda dosis de la dosis primaria	Vacunación completa 2 semanas después de la única dosis
Dosis de refuerzo Todas las personas de 12 años de edad o más deberían recibir una dosis de refuerzo al menos 5 meses después de la segunda dosis de su dosis primaria. <ul style="list-style-type: none"> Los adolescentes de 12 a 17 años solo deben de recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer 	Dosis de refuerzo Todas las personas de 18 años de edad o más deberían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer o de Moderna al menos 5 meses después de la segunda dosis de su dosis primaria.	Dosis de refuerzo Todas las personas de 18 años de edad o más deberían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer o de Moderna al menos 2 meses después de la única dosis de la vacuna contra el COVID-19 de J&J. Puede recibir la vacuna de J&J en algunas situaciones.
Con dosis de refuerzo Se considera que una persona tiene un estatus de “ estar al día ” con las vacunas contra el COVID-19 después de recibir la dosis de refuerzo.	Con dosis de refuerzo Se considera que una persona tiene un estatus de “ estar al día ” con las vacunas contra el COVID-19 después de recibir la dosis de refuerzo.	Con dosis de refuerzo Se considera que una persona tiene un estatus de “ estar al día ” con las vacunas contra el COVID-19 después de recibir la dosis de refuerzo.

Seguimos oficialmente en la pandemia del COVID-19. La semana pasada se declaró en promedio 1,000 casos diarios en el Condado de Polk. Independientemente de donde se han los casos severos ocurren en la mayoría de los no vacunados. En los datos de comparación entre personas hospitalizadas con estatus de “estar al día” con la vacunación y los no vacunados, es 44 veces más alto el riesgo en personas de 50 a 64 años de edad sin vacunarse y 49 veces más alta en personas en edades 65 y más sin vacunarse. En individuos de 18 años en adelante que han completado la dosis primaria es 16 veces más el riesgo de ser hospitalizado si no se ha vacunado. Los datos son muy claros, es tiempo de completar su dosis primaria y si es apto para la dosis de refuerzo hágalo tan pronto sea posible.