

El VIH en los latinos

Cualquier persona puede ser infectada por el VIH. En los Estados Unidos, más de 1.1 millón de personas viven con el VIH. Aproximadamente 1 de cada 5 no sabe que está infectada.

Infórmese porque el VIH es un problema de salud pública en la comunidad latina.

Cifras

- En el 2009, los latinos representaron el 20% (9,400) de las infecciones nuevas por VIH en los Estados Unidos, aun cuando solamente formaban alrededor del 16% de la población total de los E.U. La tasa del VIH en los latinos en el 2009 fue casi el triple que la de los hombres Anglo Americanos.
- En el 2009, los hombres latinos que tuvieron relaciones sexuales con hombres (HSH) representaron el 81% (6,000) de las infecciones nuevas por VIH entre los hombres latinos. Entre los HSH latinos, el 45% de las infecciones nuevas por VIH correspondió a hombres menores de 30 años de edad.
- Aunque las mujeres latinas representaron el 21% (2,000) de las infecciones nuevas en los latinos durante el 2009, la tasa del VIH fue más del cuádruple que en las mujeres Anglo Americanas.

Diagnósticos por VIH y SIDA

- 1 de cada 36 hombres latinos recibirá un diagnóstico de VIH, al igual que 1 de cada 106 mujeres latinas.
- En el 2008, se calculó que 111,438 latinos fallecieron en los E.U. con diagnóstico de SIDA.

Varios factores contribuyen a la epidemia del VIH en las comunidades latinas.

1. Los factores de riesgo relacionados con el VIH varían de acuerdo al país de origen: Los datos indican que las altas tasas del VIH diagnosticadas en hombres latinos se atribuyen al contacto sexual con otros hombres, independientemente del país de origen; los hombres nacidos en Puerto Rico tienen un porcentaje más alto del VIH atribuidas al uso de drogas inyectables
2. Las mujeres latinas podrían no estar conscientes de los factores de riesgo de su pareja masculina.
3. Tener ITS como gonorrea, clamidia y sífilis puede aumentar la posibilidad de contraer el VIH. Las tasas de ITS permanecen altas entre los latinos.
4. Los factores culturales y socioeconómicos como la pobreza, estatus migratorio, bajo nivel de estudios académicos, falta de seguro médico, acceso limitado a atención médica, barreras del lenguaje, pueden afectar el riesgo de infección por el VIH. Es posible que latinos eviten hacerse la prueba del VIH y buscar consejería o tratamiento por temor a la discriminación. Los roles tradicionales de los hombres y las mujeres y el estigma contra la homosexualidad pueden dificultar la prevención.

Hay razón para tener esperanza. Usted tiene el poder de detener el VIH. Es importante saber si tiene o no el virus. La única manera de saber si tiene el VIH es haciéndose la prueba. La prueba del VIH es gratuita, rápida y confidencial. Ya sea que tenga un resultado positivo o negativo, usted puede usar esa información para cuidarse mejor y cuidar a sus seres queridos. Para más información llame Ana Coppola al 323-5227 en el Departamento de Salud del Condado de Polk o visite <http://www.polkcountyiowa.gov/Health/pages/espanol>